

Informazioni per il paziente

Instillazioni endovesicali con Epirubicina



Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 9 - 10152 Torino

Centralino **011 5294111**
Segreteria Direzione (fax) **011 5294301**
Segreteria Centro di Formazione **011 5294481**
URP urp@ospedalecottolengo.it
CUP **011 5294381**

Gentile Signore/a,

questo è un opuscolo informativo sulla terapia endovesicale a cui lei verrà sottoposto/a, con lo scopo di chiarire le sue perplessità e di rispondere alle sue domande.

Potrà consultarlo quando ne avrà necessità.

Le raccomandiamo di leggerlo!

Il personale medico e infermieristico è sempre disponibile per ogni ulteriore chiarimento.



Cos'è l'EPIRUBICINA e a cosa serve?

L'Epirubicina è un farmaco chemioterapico che può essere utilizzato in pazienti sottoposti a resezione di neoplasia vescicale per via endoscopica. Viene somministrato in vescica per mezzo di un **catetere vescicale**: in questo modo il farmaco agisce direttamente sulle pareti della vescica, riducendo il rischio di recidive.

Quando viene somministrata?

La terapia con Epirubicina inizia **non prima di 30/40 giorni dall'intervento** endoscopico. Inizialmente prevede 1 ciclo di 6 sedute ambulatoriali una volta alla settimana.



Informazioni sulla terapia

Cosa fare prima dell'instillazione?

- Il giorno della terapia, prima di recarsi in ospedale, eseguire un'accurata igiene intima;
- Colazione e assunzione delle usuali terapie;
- Nelle 4 ore prima si consiglia di non mangiare o bere alimenti o bevande contenenti caffeina (caffè, the, cioccolato, alcolici) perché possono irritare la vescica;
- Nelle 2 ore precedenti il trattamento ridurre l'introduzione dei liquidi.

Come viene somministrata?

- Subito prima di eseguire l'instillazione, il paziente deve urinare per svuotare la vescica;
- Viene quindi posizionato un catetere vescicale estemporaneo di piccolo calibro e si procede ad iniettare il farmaco all'interno della vescica;
- Terminata l'instillazione il catetere vescicale viene rimosso;
- Il farmaco deve essere mantenuto in vescica **per un'ora**, dopodiché il paziente deve recarsi ad urinare in un recipiente con candeggina, salvo insorgenza di sintomatologia irritata grave;
- Dopo la prima instillazione il paziente viene trattenuto in osservazione presso l'ambulatorio per circa un'ora al fine di verificare che non si presentino reazioni allergiche o effetti indesiderati al farmaco.

Precauzioni dopo l'instillazione

- Dopo UN'ORA dall'instillazione il paziente deve urinare in un contenitore, preparato in precedenza con 100 ml candeggina, per inattivare il farmaco. Le urine saranno **"rosse"** in quanto il farmaco instillato è di colore rosso;
- **NON SVUOTARE IL CONTENITORE PRIMA DI UN'ORA!**
- Evitare di urinare in luoghi pubblici nelle prime ore successive al trattamento;
- Si raccomanda un accurato lavaggio delle mani e delle parti genitali dopo aver urinato per evitare l'irritazione della cute.

Quali disturbi può causare?

I possibili disturbi che potrebbero insorgere sono:

- "urgenza" minzionale o bruciori alla minzione (cistite chimica);
- presenza di sangue o coaguli nelle urine (raramente);
- malessere generalizzato, dolori osteo-articolari con lieve rialzo della temperatura corporea.

I sintomi possono avere una durata variabile e generalmente regrediscono dopo la terapia medica indicata al termine di ogni instillazione. Talvolta si possono verificare rash cutanei, segno di reazione allergica; o dermatiti da contatto.

Cosa posso fare dopo l'instillazione?

- È sconsigliato eseguire attività fisiche intense nelle prime 48 ore dopo la somministrazione del farmaco (andare in bici, fare lunghi viaggi...) ed esporsi al sole;
- Successivamente il paziente potrà riprendere le normali abitudini di vita;
- È consigliabile utilizzare il profilattico per l'attività sessuale durante il ciclo di terapia.



A chi rivolgersi in caso di problemi?

Per qualsiasi problema è possibile telefonare ai seguenti numeri:

Dal lunedì al venerdì, 8.00- 14.00
Ambulatorio urologia: **0115294394**

Negli altri giorni ed orari
Divisione di Urologia: **0115294470 / 420 / 415**